

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH diffus à grandes cellules B - 2020

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	1 (2.6%)	2.3	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (2.6%)	2.5	1 (2.8%)	2.7
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (2.8%)	2.9
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	1 (2.8%)	2.4
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	2 (5.6%)	4.9
De 45 à 49 ans	1 (2.6%)	2.3	2 (5.6%)	4.6
De 50 à 54 ans	2 (5.1%)	4.7	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	3 (7.7%)	7.4	1 (2.8%)	2.4
De 60 à 64 ans	5 (12.8%)	13.9	4 (11.1%)	10.4
De 65 à 69 ans	9 (23.1%)	28.2	5 (13.9%)	14
De 70 à 74 ans	3 (7.7%)	10.3	3 (8.3%)	9.1
De 75 à 79 ans	6 (15.4%)	31.6	9 (25%)	38.8
De 80 à 84 ans	5 (12.8%)	36.7	1 (2.8%)	5.4
Les 85 ans et plus	3 (7.7%)	24.2	6 (16.7%)	23.5

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	39	6.2	3.3	36	5.5	2.8

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000