

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH diffus à grandes cellules B - 2022

Mise à jour le 2025-08-19

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	1 (2.9%)	2.4
De 20 à 24 ans	1 (1.8%)	2.4	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	2 (3.6%)	5.6	1 (2.9%)	2.9
De 30 à 34 ans	3 (5.4%)	8.1	2 (5.7%)	5.2
De 35 à 39 ans	1 (1.8%)	2.5	1 (2.9%)	2.4
De 40 à 44 ans	3 (5.4%)	7.4	2 (5.7%)	4.7
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	3 (8.6%)	7.2
De 50 à 54 ans	6 (10.7%)	13.9	1 (2.9%)	2.3
De 55 à 59 ans	1 (1.8%)	2.4	2 (5.7%)	4.7
De 60 à 64 ans	5 (8.9%)	13.6	1 (2.9%)	2.5
De 65 à 69 ans	7 (12.5%)	21.6	5 (14.3%)	13.8
De 70 à 74 ans	5 (8.9%)	17	5 (14.3%)	14.6
De 75 à 79 ans	10 (17.9%)	46.4	2 (5.7%)	7.6
De 80 à 84 ans	9 (16.1%)	66	2 (5.7%)	10.6
Les 85 ans et plus	3 (5.4%)	23.7	7 (20%)	27.2

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	56	8.9	5	35	5.3	3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000