

Données du registre du cancer de l'Isère

Larynx - 2018

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	3 (6.7%)	6.8	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (2.2%)	2.3	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	4 (8.9%)	10.3	1 (25%)	2.5
De 60 à 64 ans	8 (17.8%)	22.8	1 (25%)	2.7
De 65 à 69 ans	9 (20%)	28.1	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	5 (11.1%)	19	1 (25%)	3.3
De 75 à 79 ans	7 (15.6%)	39.4	1 (25%)	4.6
De 80 à 84 ans	5 (11.1%)	37.7	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	3 (6.7%)	25.2	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	45	7.2	3.8	4	0.6	0.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000