

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Levres - Bouche - Pharynx - 2017

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	1 (1.6%)	2.8
De 25 à 29 ans	1 (0.7%)	2.8	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (0.7%)	2.7	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (0.7%)	2.5	1 (1.6%)	2.4
De 40 à 44 ans	5 (3.6%)	12.1	4 (6.6%)	9.7
De 45 à 49 ans	3 (2.2%)	6.8	4 (6.6%)	9.1
De 50 à 54 ans	12 (8.6%)	28.2	2 (3.3%)	4.7
De 55 à 59 ans	20 (14.4%)	52.5	9 (14.8%)	22.6
De 60 à 64 ans	28 (20.1%)	80.8	10 (16.4%)	26.8
De 65 à 69 ans	19 (13.7%)	58.6	11 (18%)	30.7
De 70 à 74 ans	23 (16.5%)	93	7 (11.5%)	25
De 75 à 79 ans	13 (9.4%)	75.4	2 (3.3%)	9.4
De 80 à 84 ans	8 (5.8%)	61.1	4 (6.6%)	21.3
Les 85 ans et plus	5 (3.6%)	43.6	6 (9.8%)	24.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	139	22.5	13.3	61	9.5	5.5

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000