

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2019

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (0.8%)	2.5	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (1.7%)	2.9
De 30 à 34 ans	1 (0.8%)	2.7	1 (1.7%)	2.6
De 35 à 39 ans	2 (1.6%)	5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	4 (3.1%)	10.1	1 (1.7%)	2.5
De 45 à 49 ans	7 (5.5%)	15.8	1 (1.7%)	2.3
De 50 à 54 ans	17 (13.3%)	39.8	6 (10.2%)	14.1
De 55 à 59 ans	21 (16.4%)	53.1	9 (15.3%)	21.7
De 60 à 64 ans	22 (17.2%)	61.8	13 (22%)	34.1
De 65 à 69 ans	12 (9.4%)	37.7	6 (10.2%)	16.8
De 70 à 74 ans	19 (14.8%)	68.4	10 (16.9%)	31.6
De 75 à 79 ans	8 (6.2%)	43.5	3 (5.1%)	13.4
De 80 à 84 ans	9 (7%)	66.5	2 (3.4%)	10.7
Les 85 ans et plus	5 (3.9%)	40.9	6 (10.2%)	23.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	128	20.5	12.3	59	9.1	5.1

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000